


# KATALOG ROSTLIN



KLUS

# JEHLIČNATÉ STROMY



## Ta b 'D A' - *Taxus baccata* 'Dovastonii Aurea' - Tis červený

**Popis:** Jehličnan z čeledi tisovité a rodu tis, který dorůstá 2 metry výšky a 4 metry šířky. Rozložitě rostoucí kultivar, jenž má zlatožluté jehlice. Je to samičí kultivar, takže na podzim se mohou objevit plody s červenými míšky. Je jedovatý. Potřebuje střední vlhkostní režim a jakýkoliv typ propustné půdy, kromě kyselé. Vzhledem k obrovským možnostem úpravy řezem je použití velmi široké.

# LISTNATÉ STROMY

## **Pr m - *Prunus mahaleb* - Mahalebka obecná**

**Popis:** Tento opadavý strom pochází z čeledi Rosaceae – růžovité a rodu *Prunus*. Mahalebka je silně větvený, strnule stavěný, rozložitý keř nebo vzácněji až 10m vysoký strom s hnědou, podélně popraskanou kůrou. Listy jsou vejčitě oválné, zelené a na okraji zoubkované. Bílé květy seskupené do hroznovitých květenství, které rozkvétají v době rašení listů, jsou příjemně vonné. Plodem jsou černé, lesklé peckovice, které jsou na chuť velice hořké.

Keř je teplomilný, nesnáší trvalejší zastínění. Mrazuvzdornost tohoto druhu je do -34°C (zóna 4). Velice dobře snáší městské znečištění. Preferuje středně těžkou, jen mírně vlhkou půdu a slunné či polostinné stanoviště.



# LISTNATÉ KEŘE



## **Eu f 'C' - *Euonymus fortunei* 'Coloratus' - Brslen Fortuneův 'Coloratus'**

**Popis:** *Euonymus fortunei* 'Coloratus' je stálezelený keř původem z Číny, který se řadí do čeledi Celastraceae – jesencovité. Dorůstá do výšky 0,2-0,5 m a vytváří půdopokryvný, kompaktní keř. Vejčité, tmavě zelené listy s jemně vroubkovaným okrajem se na podzim vybarvují do růžových nebo purpurových odstínů.

## **Hy a 'A' - *Hydrangea arborescens* 'Annabelle' - Svída bílá**

**Popis:** *Annabelle* je léty prověřená odrůda hortenzie. Její název stromečkovitá je poněkud zavádějící, neboť se jedná o keř dorůstající výšky pouze cca 1,5m. Její květy se objevují v polovině léta a jsou to velmi velké, až 18 cm široké, kulaté laty nejprve limetkově nazelenalých kvítků, měnící se ve skvostně sněhově bílou. Listy jsou středně až tmavě zelené, podle kvality půdy spíše matné.







### **Hy p 'L' - *Hydrangea paniculata* 'Limelight' - hortenzie latnatá**

**Popis:** Opadavý, kompaktní keř. Dosahující výšky 1,2-1,6m. Listy vstřícné, někdy spirálovitě postavené, jednoduché, 7-14 cm dlouhé, 3-7,5 cm široké, eliptické až oválné, na bázi zaoblené, zubaté. Středně až tmavozelené, řídce ochlupené, shora lysé, řapík dlouhý až 2,5 cm. Nové listy jsou zelené, bez červeného pigmentu, ačkoliv řapíky mohou být červené. Květenství tvoří vzpřímené laty až 30 cm dlouhé a 10-15 cm široké. Kvítky vykvétají od spodu laty k jejímu vrcholu. Začínají nakvétat koncem července zeleno bílými latami, později přechází barva květů do krémově bílé až lehce narůžovělé.

### **Pr I 'G T' - *Prunus laurocerasus* 'Grüner Teppich' - Bobkovišeň lékařská**

**Popis:** Tento stálezelený keř pochází z čeledi Rosaceae – růžovité a rodu *Prunus*. Dorůstá do výšky jen kolem 0,5 m a vytváří široce rozložitý keř. Květy jsou drobné, pětičetné, bělavé, sestavené do hroznovitých květenství. Na rostlině se objevují v průběhu května a svou vůní lákají motýly. Kvetení se může opakovat i na podzim. Plody jsou drobné, černé, lesklé peckovice, které jsou jedovaté. Preferuje polostín a humózní, živnou, vlhkou půdu. Mrazuvzdornost dřeviny je do -12°C (zóna 7). V bezmrazých dnech v zimě je důležité rostlinu zalévat.



# TRVALKY A TRÁVY



## **An h 'H J' - Anemone japonica 'Honorine' - Sasanka japonská**

**Popis:** Anemone japonica 'Honorine Jobert' patří mezi sasanky kvetoucí na podzim. První bílé květy rozkvétají od srpna a kvetení pokračuje až do konce října. Květy vyrůstají na stonku jednotlivě nebo seskupeny po několika do řídkých květenství. Květy sasanek jsou vhodné k řezu. patří mezi sasanky kvetoucí na podzim. První bílé květy rozkvétají od srpna a kvetení pokračuje až do konce října. Květy vyrůstají na stonku jednotlivě nebo seskupeny po několika do řídkých květenství. Květy sasanek jsou vhodné k řezu.

## **Ar s - Aruncus sylvestris – udatná lesní**

**Popis:** Aruncus je nádherná statná bylina, naše domácí. Dorůstá do výšky až 1m. Od června do konce července kvete nádhernými velkými latami smetanově bílých květů. Velmi působivé je i její olistění. Listy jsou velké, složené z menších, vejčitých, svěže zelených lístků.







### **Aste d 'S' - Aster dumosus 'Schneezicklein' – Hvězdnice keříčkovitá**

**Popis:** Hvězdnice keříčkovitá patří k opadavým trvalkám z čeledi Asteraceae – hvězdnicovité. Pochází z préríí Severní Ameriky, kde se dokonale adaptovala na náročnější klimatické podmínky. Jako okrasné rostliny byly hvězdnice dovezeny do Evropy, kde se díky šlechtění podařilo odstranit řadu nedostatků původních odrůd. Nové odrůdy se tak vyznačují vysokou odolností, pestrou paletou barev, vytrvalým podzimním kvetením a v neposlední řadě bohatou zásadou květů. Kultivar 'Schneezicklein' nebývá nic dlužen pověsti nejkrásnější trvalky a vyniká kompaktními trsy, které vytvářejí efektní sytě zelené polštáře. To nejlepší však teprve přijde během září a října, kdy se trsy pokryjí úbory velkých, bílých květů se žlutým terčem uprostřed. Dospělá rostlina dorůstá přibližně do výšky 30 cm.

### **Asti a 'B' - Astilbe arendsii 'Brautschleier' – Čechrava Arendsova**

**Popis:** Astilbe arendsii, česky čechrava Arendsova, je vytrvalá rostlina se zatahujícím listem. Řadí se do čeledi Saxifragaceae - lomikamenovité. I když pochází z Dálného Východu, je vzhledem podobná naší domácí udatně (Aruncus). Odrůda Brautschleier je vzrůstnější, dorůstá výšky kolem 60 cm. Má bílá vzpřímená květenství vyrůstající z hustého trsu tmavě zelených zpeřených listů. Kvete od června do července.





### **Ci r - Cimicifuga racemosa – kakost**

**Popis:** Cimicifuga racemosa var. cordifolia též Actaea racemosa var. cordifolia, česky ploštičník hroznovitý, pochází ze západní části Severní Ameriky. Je to opadavá trvalka, která tvoří trsy tmavě zelených, trojčetně složených listů. Dorůstá výšky od 40 do 150 cm, kdy nejvyšší je v době kvetení. Kvete od července do září bílými vonnými květy nahloučenými v latách. Po odkvětu, se tvoří bobule, které jsou však jedovaté. Rostlina tvoří silné oddenky, obsahující glykosidy a terpeny, které jsou svými účinky podobné estrogenům. Využívá se k tvorbě léčivých extraktů.

### **Co m - Convallaria majalis - Konvalinka vonná**

**Popis:** Convallaria majalis, česky známá jako konvalinka vonná, je velmi oblíbenou z jara kvetoucí vytrvalou bylinou. Je rozšířena po celé Evropě a severní Asii, kde roste ve světlých lesích, křovinách i na loukách, na vlhčích půdách, od nížin až po subalpínský stupeň. Řadí se do čeledi Asparagaceae - chřestovité.

Konvalinka je až 30 cm vysoká silně jedovatá rostlina s plazivým oddenkem. Listy jsou většinou dva, jednoduché, celokrajné a mezi nimi vyrůstá přímý stvol nesoucí hrozen bílých, vonných, zvonečkovitých květů. Kvete od května do června. Plodem jsou červené bobule.







### **He 'M F' - Heuchera 'Mint Frost' - Dlužicha**

**Popis:** Tuto vytrvalou rostlinu řadíme do čeledi Saxifragaceae – lomikamenovité. Původní druhy rostliny pocházejí ze Severní Ameriky. Druh „Mint Frost“ vyniká mramorovanými, fialovo-zelenými listy s výraznou žilnatinou. Listy na zimu nezatahují a postupně se během roku vybarvují do vícera odstínů. Trvalka kvete od června do srpna červenými zvonkovitými květy. Dospělá rostlina dorůstá do výšky 40 cm.

### **Ph P 'W A' - Phlox paniculata 'White Admiral' - Plamenka latnatá**

**Popis:** Phlox paniculata je domácí trvalkou Severní Ameriky, kde roste na mýtinách v řídkých lesích či křovinách, podél potoků na stráních, často na vápencovém podloží. Trsy se rozšiřují krátkými oddenky, ze kterých vyrůstá několik vzpřímených, částečně dřevnatějících stonků dosahujících v přírodě výšky až 2 m. Stonky nesou vstřícné, 5 – 15 cm dlouhé, široce kopinaté, matně sytě zelené listy. Plamenky kvetou až 5 týdnů. Bohatá květenství jsou složena z plochých, zhruba 3 cm velkých, často vonných květů.





### **Se a - *Sesleria autumnalis* - Pěchava podzimní**

**Popis:** Pérovník pštrosí je jednou z nejznámějších a u nás původních, evropských kapradin. Najdete jej přirozeně rostoucí v lesích, na lehce přistíněných místech i na mokřích loukách.

Zdobí jej dlouhé a přísně vzpřímené vějíře listů, které mají svěže zelenou barvu při rašení i během sezóny. V ideálních podmínkách může dorůst až 1,5m na výšku, ale většinou se drží do cca 80 cm. Rozrůstá se podzemními oddenky, které lze snadno odstranit, pokud si nepřejete její přirozené rozšiřování.

Ideální umístění je polostín nebo rozptýlené světlo, ale ve vlhké půdě poroste výborně i na slunci. Potřebuje lehkou, mírně kyselou půdu, která nebude vysychat. Na jaře odřežte staré listy těsně nad zemí. Plně mrazuvzdorný do min. - 34°C.